

rol., Biol. 1: 22, 1964). 14b./14e. Žiar nad Hronom [P r a c h in B e n č a ť o v á e t U j h á z y (eds.) Florist. Kurz Zvolen 1997, p. 27, 1998].

O c h r a n a. Najnovšie poznatky poukazujú na nevyhnutnosť zaradenia do kategórie menej ohrozených druhov.

5. *Erysimum odoratum* E h r h.

Horčičník voňavý

Ic.: Tab. 22, fig. 3, p. 201

Erysimum odoratum E h r h. Beitr. Naturk. 7: 157, 1792.

Syn.: *Cheiranthus erysimoides* L. 1753. - *Erysimum pannonicum* C r a n t z 1762. - *E. erysimoides* (L.) F r i t s c h 1907, nom illeg. - *E. vagicum* H o l u b, M ě s i č e k e t J a v ů r k o v á, nom. inval. - *E. carpaticum* V. M i c h a l k o v á, nom. inval.

Dvojiročná bylina. Koreň drevnatejúci, s priemerom až 0,6 cm, hnedastý. Byl 15–95 cm vysoká, nevýrazne 4-hranná, jemne ryhovaná, na báze chlpatá, smerom k vrcholu roztrúsene chlpatá (s prevahou vidlicovitých chlпов), zelenkastá, niekedy fialkastá. Listy ružice stopkaté, podlhovasté; stopka listu 0,4–1 cm dlhá, mierne odstavajúco chlpatá (chlpy prevažne vidlicovité); čepeľ hlboko oddialene zúbkatá, 1,7–4×0,2–0,6 cm veľká, na líci aj na rube jemne drsno pritisnuto roztrúsene chlpatá (chlpy najmä 3-ramenné) a na hlavnej žile chlpatá (chlpy len vidlicovité), hnedozelená až modrastozelená, často s karmínovým odtieňom; listy v dolnej časti byle stopkaté; stopka 0,3–1 cm dlhá; čepeľ obrátene kopijovitá až úzko obrátene vajcovitá, hlboko až plytko oddialene zúbkatá, 2–7×0,3–1,3 cm veľká, na líci aj na rube pritisnuto až mierne odstavajúco roztrúsene chlpatá (chlpy najmä 3-ramenné), na hlavnej žile chlpatá (chlpy prevažne vidlicovité), zelenohnedá, niekedy s karmínovým nádychom, na rube svetlejšia; listy v hornej polovici byle sediace; čepeľ 2–5,8×0,3–1,3 cm veľká, hráškovozelená, na rube o niečo svetlejšia, na líci aj na rube roztrúsene pritisnuto chlpatá (chlpy prevažne 3-, 4- aj 5-ramenné), na hlavnej žile s vidlicovitými chlpmi. Vreteno súkvetia pritisnuto roztrúsene chlpaté (chlpy prevažne 3-ramenné). Listene len v dolnej časti súkvetia, úzko elipsovité, 1–2×0,1–0,3 cm veľké, hráškovozelené, na líci aj na rube roztrúsene mierne odstavajúco chlpaté (chlpy najmä 3-ramenné), na báze často husto chlpaté (chlpy prevažne vidlicovité), na rube striebrozelené. Stopky kvetov 4-hranné, 3–7 mm dlhé, mierne odstavajúco chlpaté (chlpy prevažne vidlicovité a 3-ramenné), zväčša zelenkasté, niekedy fialkasté. Kališné lístky 7–12,5×1–3,5 mm veľké, na vonkajšej strane pritisnuto roztrúsene chlpaté až chlpaté, na vnútornej holé, bledozelené, na vrchole často s karmínovým nádychom. Korunné lupienky 12–26 mm dlhé; lupeň 4–11×4–11 mm veľké, bledo- až sýtocitrónovožlté, vzácne až takmer oranžovožlté, holé. Tyčinky 9–15 mm dlhé, holé. Šesule 32–100×0,7–1 mm veľké, hráškovozelené, často purpurasté, husto chlpaté (rôzne druhy chlпов), na hranách holé až roztrúsene chlpaté (chlpy prevažne vidlicovité); čnelka na plode o odtieň tmavšia, ca 1–2 mm dlhá, riedko chlpatá (chlpy 3- a 4-ramenné). Stopky plodov šikmo